

# Cmab+FOLFIRI

Cmab(セツキシマブ、アービタックス)、フルオロウラシル、イリノテカン、レボホリナート

★EGFR 陽性で Kras 変異がないことを確認後、Cmab を投与

投与間隔

Cmab (毎週) day1, day8, day15, day22, day29 . . . . .

FOLFIRI (隔週) day1, day15, day29 . . . . .

Day1

生食 250mL でルート確保

①レスタミン(10) 5T 1x (Cmab 投与の 30-60 分前に)

②生食 100mL+デカドロン 3.3mg 3A+グラニセトロン 3mg1A 30 分程度

③ (初回) 生食 500mL + Cmab 400mg/m<sup>2</sup>  
全量を 500mL となるよう調整する 120 分かけて  
(2 回目以降) 生食 250mL + Cmab 250mg/m<sup>2</sup>  
全量を 250mL となるよう調整する 60 分かけて

④生食 100mL 60 分程度

**Cmab による infusion reaction の観察を 1 時間行う**

⑤レボホリナート 200mg/m<sup>2</sup> + 5%ブドウ糖 250mL 120 分

⑥イリノテカン 180mg/m<sup>2</sup> + 5%ブドウ糖 250mL 90 分

**⑤と⑥は同時に投与を開始する**

⑦フルオロウラシル 400mg/m<sup>2</sup> + 生食 50mL 全開

⑧フルオロウラシル 2400mg/m<sup>2</sup> + 生食 全量 100mL となるように調整しインフューザーポンプで 46 時間投与

Day2, day3 デカドロン(4) 2T 1x 内服

Day8, day22 . . . は①-④で終了